

# ESPECIES AMENAZADAS!

## CIGÜEÑA NEGRA (*Ciconia nigra*)



CLASE:	Aves
ORDEN:	Ciconiformes
FAMILIA:	Cicónidas

### RASGOS MORFOLÓGICOS:

Esta ave zancuda de gran tamaño destaca por su plumaje negro lustroso (con reflejos verdes y lilas en el cuello y la cabeza), que la diferencia de la cigüeña blanca. Su pecho y vientre son de color blanco, y las patas y pico de tonalidades rojizas, sin existir dimorfismo sexual. Pesa en torno a los 3 kg., y su envergadura oscila entre los 144 y los 155 cm.

### HÁBITAT:

La cigüeña negra busca para vivir los rincones más apartados y alejados de los enclaves humanizados, intentando pasar desapercibida. Prefiere los parajes menos alterados, agrestes e inaccesibles, nidificando en la espesura de los bosques mediterráneos (encinares, alcornoques, pinares, ...), en corta-

dos fluviales o en las gargantas de montaña; y siempre en las proximidades de ríos, embalses o pantanos donde poder pescar.

### DISTRIBUCIÓN:

En España se localizan poblaciones nidificantes de esta cicónida en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, sobre todo a lo largo de las cuencas de los ríos Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Hay datos que señalan a la provincia de Cáceres como la poseedora del 40 por ciento de la población.

Existen también destacadas poblaciones en Europa Oriental y Asia, dentro de la región Paleártica, además de una colonia aislada en Sudáfrica.

### ALIMENTACIÓN:

Esta especie se alimenta principalmente de peces, a los que captura hábilmente con su largo pico en las

orillas de ríos, embalses, lagunas y charcas. Su dieta la complementa con pequeños roedores, reptiles, anfibios, insectos y todo tipo de invertebrados acuáticos y ribereños.

### REPRODUCCIÓN:

Las cigüeñas negras llegan a la Península Ibérica durante los meses de febrero y marzo. Su primera ocupación consistirá en reparar el viejo nido de otros años o en construir uno nuevo, trabajo que les llevará varios días transportando raíces, musgo y hierba. Los nidos se sitúan en los árboles o en acantilados rocosos, en lugares tranquilos y apartados que eligen cuidadosamente.

Durante el cortejo nupcial, los dos miembros de la pareja rozan frecuentemente sus picos y se espulgan mutuamente el plumaje. El macho danza ostentosamente alrededor de la hembra y le da suaves picotazos, hasta conseguir que ésta se muestre receptiva. Momento que aprovecha para saltar sobre su espalda y consumir la cópula, en una acrobática postura que pone a prueba el sentido del equilibrio de estas zancudas.

Al cabo de unos días se produce la puesta, normalmente entre mediados de abril y principios de mayo. Consta de 3 a 5 huevos blancos y lisos con un ligero tinte verdoso, que son puestos a intervalos de aproximadamente 2 días.

La incubación tiene lugar a lo largo de 35-42 días, y aunque los dos miembros de la pareja se turnan en esta trascendental etapa reproductora, la mayor parte de la responsabilidad le corresponde a la hembra. Los polluelos están recubiertos de un fino plumón blanco, tienen el pico corto y de




color amarillo, y las patas rosadas. Permanecen en el nido entre 65 y 70 días, durante los cuales son alimentados solícitamente por sus progenitores, que generalmente son recibidos a picotazos y sin demasiados miramientos.

Con la llegada del verano comienzan sus primeros vuelos, y cuando son capaces de alimentarse por su cuenta, abandonan el nido. En los días previos a la migración, diversos grupos familiares se agrupan en áreas favorables con abundancia de alimento, haciendo acopio de reservas energéticas antes de emprender el largo viaje.

#### COSTUMBRES:

Como su próxima pariente, la cigüeña blanca, esta especie se muestra fiel a su pareja durante muchos años, manteniéndose unidos generalmente de por vida. Y ambos regresan cada año al mismo nido.

Pero al contrario que la blanca, que suele ser gregaria y busca la proximidad del hombre para instalarse y criar, la cigüeña negra es de carácter solitario y se muestra mucho más esquiva, buscando lugares escondidos y apartados del hombre para anidar.



Esta ave migratoria recorre grandes distancias para pasar el invierno en el África subsahariana. En primavera regresa para nidificar en Europa, excepto una colonia asentada en Sudáfrica. Se sabe muy poco sobre los lugares donde pasa el invierno.

#### PROBLEMÁTICA CONSERVACIONISTA:

La acelerada regresión de la cigüeña negra se debe principalmente a la pérdida de sus hábitats y sitios de nidificación, puesto que precisa de lugares especiales, en los que no haya intervenido el hombre, y que cada vez son más escasos, debido a factores como la deforestación o la construcción.

En menor medida, también han influido la caza ilegal y las molestias durante la reproducción.

Se calcula que la población española es de unas 175 parejas en la actualidad, estando catalogada "en peligro de extinción". Las líneas de actuación deben encaminarse hacia la protección de sus hábitats y el seguimiento de la especie.

*Texto: INÉS SANTOS y CARLOS SANZ  
Fotografías: CARLOS SANZ*