

# ESPECIES AMENAZADAS!

## ÁGUILA REAL (*Aquila chrysaetos*)



CLASE:	Aves
ORDEN:	Accipitriformes
FAMILIA:	Accipítridas

### RASGOS MORFOLÓGICOS

Es la más grande y poderosa de las águilas ibéricas, con una envergadura que a veces llega a superar los dos metros y medio, aunque generalmente oscila entre los 180 y los 230 cm. Mide entre 75 y 90 cm de longitud, y alcanza un peso de entre 3 y 5 kg y medio, siendo mayores las hembras que los machos. Las alas del águila real son anchas y largas, y su cola alargada es de extremo cuadrado. Los adultos presentan una coloración pardo oscura en el dorso, con reflejos dorados en la cabeza y la nuca, siendo las partes inferiores también pardas, aunque algo más claras. En la cola se dibujan bandas poco definidas de color gris oscuro, y

en su base pueden aparecer algunas plumas blancas. Los ojos son castaños, y la cera del pico y los dedos de color amarillo vivo. El plumaje de los jóvenes es más oscuro que el de los adultos, y presenta manchas blancas muy marcadas en las alas y en la base de la cola, que poco a poco se van reduciendo en mudas sucesivas, hasta desaparecer definitivamente a los cuatro o cinco años. Las patas están emplumadas hasta el arranque de los dedos.

### HÁBITAT

Esta especie habita principalmente en zonas montañosas, aunque también frecuente otras de menor altitud siempre que existan cortados rocosos en los que anidar. Suele evitar las llanuras, instalándose generalmente en laderas de montañas y en acantilados costeros. Cada pareja cubre un territorio muy amplio, con una extensión que suele oscilar entre los 125 y los

275 kilómetros cuadrados, abarcando dentro de él distintos biotopos: roquedos, bosques, matorrales, zonas cultivadas y de pastos...

### DISTRIBUCIÓN

El águila real es una de las pocas especies de águilas que se encuentran distribuidas por cuatro continentes, faltando únicamente en Oceanía. Está presente en todas las grandes sierras y sistemas montañosos de la Península Ibérica, principalmente en el Sistema Central, Extremadura, Picos de Europa, Pirineos, Sierras de Cazorla y Segura y Sistema Ibérico.

### ALIMENTACIÓN

La mayor parte de sus presas son especies de pequeño o mediano tamaño, total o parcialmente diurnas, y preferentemente mamíferos: liebres, conejos, marmotas, relictos de ungulados (corzo, rebeco, cabra montés,...) o crías de ciertos carnívoros, como zorros. También capturan algunos reptiles (lagartos y culebras) y diversas aves, especialmente palomas, perdices y córvidos. Y si las presas escasean, pueden alimentarse asimismo con las carroñas de animales domésticos o silvestres, desde una oveja hasta un venado. En época de cría es cuando cazan con más frecuencia animales de mediano tamaño, pues necesitan llevar más alimento al nido.

### COSTUMBRES

Es un ave discreta y silenciosa, que suele pasar desapercibida, incluso cuando vive cerca de lugares habitados, si bien en época de celo emite unos característicos y agudos sonidos, audibles a gran distancia. Las águilas reales son sedentarias, y aunque varias parejas vecinas pueden superponer sus territorios de caza,



sobrevolando la misma zona en busca de alimento, cada una de ellas posee un territorio de nidificación de menor extensión, mucho más restringido, y del que expulsarán con agresividad a cualquier intruso. El vuelo de estas aves es regular, con aletazos potentes o planeos, a veces a gran altura. A primeras horas del día empiezan sus vuelos de caza, unas veces en solitario y otras en pareja, volando generalmente a poca altura, siguiendo las laderas montañosas y precipitándose a gran velocidad sobre la presa una vez divisada, cayendo sobre ella con las garras extendidas. Son aves fuertes, poderosas y agresivas, que poseen un gran poder de aceleración y pueden alcanzar en sus picados una velocidad punta de 200 kilómetros por

hora. El peso máximo que pueden levantar con sus garras es de 2 kg y medio, por lo que si la presa es grande y la localizan enriscada intentarán despeñarla, y bajarán luego a por el cadáver.

#### REPRODUCCIÓN

Cada pareja de águilas reales suele regentar varios nidos dentro de su territorio, lo que les permite ocupar cada año el más adecuado en relación a las condiciones climáticas, la seguridad o la disponibilidad de presas. Generalmente están situados en cornisas de paredes rocosas, cortados fluviales o acantilados costeros, casi siempre a gran altura y en lugares de difícil acceso, aunque con mucha menor frecuencia los instalan en lo alto de grandes árboles. Como cada año aportan nuevas ramas a los nidos, y éstos pueden alcanzar una altura de 150 cm y un diámetro de más de dos metros. El celo tiene lugar entre enero y febrero, y los galanteos amorosos (siempre con la pareja de años anteriores) resultan ciertamente espectaculares. Los vuelos nupciales consisten básicamente en arriesgados y exhibicionistas picados, quiebros impresionantes y volteos en todas direcciones, siempre en las cercanías del nido escogido para la crianza. Tras las cópulas, que suelen producirse entre finales de febrero y comienzos

de abril, las hembras ponen 1-3 huevos (generalmente dos), de color blanco y con manchas pardo rojizas de extensión variable. La puesta de estos huevos suele realizarse a intervalos de 2-5 días, y la incubación dura unos 43-45 días. Los pollos pesan al nacer unos 100 gr, y están recubiertos de un plumón blanco grisáceo. Las plumas empiezan a salirles entre los 21 y los 25 días, y realizan su primer vuelo hacia los 75 días, cuando ya alcanzan un peso y un tamaño similar al de los adultos. Entre los pollos de águila real es bastante frecuente el "cainismo", pues al nacer con 4-5 días de diferencia los más grandes suelen acaparar el alimento, o incluso llegan a matar a picotazos o a expulsar del nido a los hermanos menores. Tras los primeros vuelos, los jóvenes aguilucho vuelven al nido y permanecen en él hasta el invierno, o incluso hasta la siguiente primavera, cuando sus padres entran de nuevo en celo. Los jóvenes viven errantes durante sus primeros años de vida, asentándose definitivamente en un nuevo territorio al alcanzar la madurez sexual y buscar pareja, a los 4-5 años de edad. La longevidad de la especie puede superar los 50 años.

#### PROBLEMÁTICA CONSERVACIONISTA

El águila real está protegida en España desde 1973, como el resto de las aves rapaces. Figura en la "Lista Roja de los Vertebrados de España", con la categoría de "rara", es decir, que sin pertenecer a las categorías de "en peligro" o "vulnerable", sus poblaciones corren riesgo. La población nidificante en la Península Ibérica se estima en unas 1.000 parejas, aproximadamente, y las principales amenazas para la supervivencia de la especie son los tendidos eléctricos, los venenos, la persecución ilegal por parte de guardas y propietarios de cotos cinegéticos, la caza furtiva y las perturbaciones humanas de todo tipo en sus áreas de cría, especialmente durante el período reproductor.

*Texto: Pilar Pareja y Carlos Sanz  
Fotos: Carlos Sanz*